

Encefalitis virales con manifestaciones psiquiátricas.

Encefalitis virales a inicio clínico psiquiátrico o como única manifestación.

Alicia Gravina, Yisella Díaz, Mario Orrego Bonavita.

A propósito de tres casos clínicos de encefalitis por Virus Varicela Zoster, con manifestaciones psiquiátricas.

Debido a que las encefalitis virales afectan al encéfalo directamente, pueden ocurrir alteraciones de la conciencia, conductuales, crisis epilépticas y signos neurológicas focales.

Los cuadros residuales post-encefálicos pueden provocar alteraciones intelectuales, mnésicas y también cuadros afectivos y caracteriales y psicóticos muy semejantes a los endógenos.

La encefalitis VZV como complicación del herpes Zoster o de la varicela es para o post infecciosa, los casos van de leves a graves y evolución al coma y muerte. Existen posibilidades de secuelas permanentes a exclusiva manifestación psiquiátrica.

Cuando la anamnesis detecta datos epidemiológicos previos concordantes para el diagnóstico específico (infección viral reciente) destacamos la importancia de confrontar hipótesis diagnósticas presuntivas, diferir el diagnóstico positivo e incluir la posibilidad de un diagnóstico etiopatogénico mediante la paraclínica y seguimiento con controles evolutivos, que conducen a un menor margen de error diagnóstico, disminuyendo la posibilidad de incurrir en conductas yatropatogénicas.

Destacamos la pertinencia del rediagnóstico como pilar fundamental que modifica el tratamiento, evolución, pronóstico y calidad de vida de esta casuística.—